

FIRMAGON® (degarelix)

Instruktioner för beredning och administrering



Indikation: FIRMAGON® är en GnRH-antagonist indicerad för behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer.

Förenklad hantering med FIRMAGON®

Rekommenderad dos av FIRMAGON® är en injektion per månad. **Initialdosen** ges endast en gång vid behandlingens början och består av 240 mg administrerat som två djupa subkutana injektioner á 120 mg i 3 ml lösning. **Underhållsdosen** ges varje månad administrerat som en djup subkutan injektion á 80 mg i 4 ml lösning.

Innehåll i respektive förpackning

Initialdos → FIRMAGON® 240 mg



- 2 injektionsflaskor med **120 mg** degarelix (pulver)
- 2 förfyllda sprutor med **3 ml** spädningsvätska
- 2 sprutkolvar
- 2 adapterar till injektionsflaska
- 2 injektionsnålar



Underhållsdos → FIRMAGON® 80 mg



- 1 injektionsflaska med **80 mg** degarelix (pulver)
- 1 förfylld spruta med **4,2 ml** spädningsvätska
- 1 sprutkolv
- 1 adapter till injektionsflaska
- 1 injektionsnål

- Oberedd FIRMAGON® kan förvaras i rumstemperatur. Efter beredning bör FIRMAGON® användas **omedelbart** dock senast 2 timmar efter beredning.

Tips & Råd

Minimering av biverkningar vid injektionsstället

- Långsam injektion under minst 30 sekunder har visats minska risken för reaktioner vid injektionsstället.
- Biverkningar vid injektionsstället är vanligare med startdosen än med underhållsdosen.

Informera patienten

- Intag av paracetamol eller ibuprofen har använts för att lindra reaktioner vid injektionsstället.
- Patienter har också använt nedkylning med t ex is.
- Patienten kan uppleva övergående frossa, feber eller influensaliknande symtom timmarna efter administrering.

Följ noga bruksanvisningen nedan

1



- **Avlägsna** skyddet
- **Desinficera** gummiproppen med sprit
- **Sätt fast** adaptern på injektionsflaskan

2



- Sätt fast sprutkolven på sprutan
- Ta bort skyddshatten

3




- Överför all spädningsvätska till injektionsflaskan med pulver

4



- Snurra försiktigt tills vätskan är klar och utan olösta partiklar
- **Undvik skumbildning**

5




- Vänd injektionsflaskan upp- och-ner och **dra upp** lösningen **till markeringen** på injektionsspruta
- Se alltid till att dra upp exakt volym

6




- Sätt fast nålen för djup subkutan injektion på sprutan

7



- Injicera i någon av dessa fyra kvadranter
- Injicera inte i områden där patienten exponeras för tryck

8



Utför en djup subkutan injektion:

- **Stick in nålen djupt** i minst 45 graders vinkel
- **Injicera långsamt under minst 30 sek**, omedelbart efter beredningen

9



- **Upprepa beredningsproceduren** med nästa 120 mg injektionsflaska till patienter som får initialdos. Välj ett annat injektionsställe.



FIRMAGON® (degarelix) Rx, (F)* ATC-kod: L02BX02.

BEREDNINGSFORM: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80 mg och 240 mg.

INDIKATION: FIRMAGON är en gonadotropinfrisattande hormon (GnRH)-antagonist indicerad för behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer. **SPC UPPDATERAD:** 2017-04-24. För ytterligare information och senaste prisuppgift, se www.fass.se.

SVENSKT OMBUD: Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö. Tel: 040-691 69 00.

*Subventionerat för patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer med svåra symtom i behov av snabb kastrationseffekt till dess att stabilisering av det akuta skedet uppnåtts.