

Klyx®

Dokusatnatrium
Sorbitol

Att ge KLYX
med hjälp av
nelatonkateter



Klyx® 1 mg/ml + 250

dokusatnatrium/sorbitol
Rektallösning

Används vid tillfällig förstoppning.

Läs bipacksedeln före användning.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.


OBS!

När KLYX ska ges i hemmet kan det vara praktiskt att vara i badrummet så att toaletten finns nära.




1

Innan användning kan man värma KLYX till kroppstemperatur i ett vattenbad.



35–37
grader



2

Dra av hylsan som skyddar pipen och vrid sedan av förslutningen på toppen av pipen.




3

Trä på nelatonkatetern på KLYX-pipen med ett bestämt tryck (se foto).

Smörj in änden på katetern med lite vaselin eller tempgel.

4

Bädda med en handduk eller liknande direkt på badrumsgolvet och låt personen som ska få KLYX ligga på vänster sida med benen uppdragna. Att ligga plant på vänster sida underlättar för vätskan att göra så stor nytta som möjligt eftersom den delen av tarmen som ska tömmas är lokaliserad på vänster sida i kroppen.



5

För försiktigt in nelatonkatetern i ändtarmen. Det är väldigt viktigt att inte pressa in slangen om det tar stopp för då kan man skada tarmen. Det kan underlätta att komma lite längre in om man försiktigt trycker ut lite KLYX-vätska medan katetern förs inåt. Om det går väldigt lätt att föra in katetern kan man försiktigt föra in den ca 15–20 cm. På så sätt kommer KLYX längre in i tarmen och hinner göra större nytta.

6

När man pressar ut innehållet ur flaskan ska man hålla på sidorna av flaskan som visas i bild A.



7

Tryck sakta ut vätskan medan du hela tiden berättar för den du ger KLYX vad som händer.

Om det spänner i ändtarmen kan man pausa några sekunder innan man sakta fortsätter tömma ut resten.

8

När flaskan är tömd dras slangen ut försiktigt medan flaskan fortfarande hålls ihoptryckt för att förhindra återsug. Släng både flaska och slang i soptunna efteråt.

9

Den som fått lavemanget kommer att känna sig väldigt bajsnödig. Lugna personen och uppmuntra till att försöka hålla sig en stund. KLYX gör större nytta om man ligger kvar på vänster sida eller möjligen vänder sig på rygg. Om det går bör man hålla sig i 5–20 minuter för att lavemanget ska göra så stor nytta som möjligt. Självklart väljer den som fått KLYX själv när det är dags att sätta sig på toaletten.



Man kan använda KLYX vid förstoppning och till att tömma tarmen inför operation eller undersökning av tarmen samt före förlossning.

KLYX är en ofärgad, inte helt klar, trögflytande vätska. KLYX förs in i ändtarmen och verkar genom att smörja tarmsidorna och vätska upp avföringen. Hård avföring mjukas upp. Vätskan i tarmen skapar ett naturligt behov av att gå på toaletten. KLYX verkar efter 5–20 minuter. De normalt fungerande tarmreflexerna störs ej.

Läs noga igenom bipacksedeln i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.

Ibland kan det underlätta att använda en nelatonkateter när KLYX ska ges. En nelatonkateter är en halvmjuk, böjlig slang med rundad ände som träs på pipen på KLYX-flaskan.



*Nelatonkatetern träs på
KLYX-flaskan med ett bestämt tryck.*

Nelatonkatetern kan kännas skonsammare att få in i ändtarmen just för att den är böjlig och har en mjukt rundad ände jämfört med den hårdare pipen på KLYX-flaskan. Det kan också vara enklare att klämma ihop flaskan en liten bit bort från skinkorna då man får lite mer spelrum med hjälp av katetern.

Det är viktigt att berätta för personen som ska få KLYX vad som ska göras. Om man är förberedd på vad som ska hända blir man mindre spänd och orolig. En vanlig orsak till att man får KLYX är förstoppning. Förklara då att KLYX är en sorts vätska som ska hjälpa till att mjuka upp avföringen så att den kommer ut lättare.

Visa slangen så att man ser hur smal den är. Den får lätt plats i ändtarmen utan att göra ont. Följ de instruktioner ni fått av vårdpersonalen angående vilket lavemang som ska ges, vilken mängd samt hur ofta.

KLYX finns i följande förpackningar:

- 1 x 120 ml
- 10 x 120 ml
- 1 x 240 ml
- 10 x 240 ml

På medicininstruktioner.se kan man se en instruktionsfilm om hur man använder KLYX utan kateter.



medicin
instruktioner.se

Denna patientinformation är framtagen av Ferring Läkemedel AB i samarbete med Cecilia Larsson, Västmanlands sjukhus Västerås.

Klyx® (Dokusatnatrium och sorbitol).

Beredningsform: Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml.

Indikation: Obstipation av olika genes. Tarmrensning före rektoskopering, partus och röntgenundersökning av bäckenregionen.

ATC-kod: A06AG10.

SPC uppdaterad: 2015-03-26. Receptfritt, F.

Ytterligare information, se www.fass.se



Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö.
Tel: 040-691 69 00 www.ferring.se